

Inleiding

Tijdens onze wandeling kan je tal van bloemen ontdekken.

Dit is absoluut geen volledig overzicht, maar wel een kennismaking met enkele minder gekende bloemen, die je hier op de Keer kan ontdekken in de vroege lente, de latere lente en de zomer.

Onze [wandeling over de Keer](#) verdelen we in drie etappes.

Scan de QR codes tijdens de wandeling, je krijgt telkens een linkje te zien naar de juiste etappe.

Wat je te zien krijgt hangt natuurlijk af van het seizoen.
Per etappe lees je wat je hier kunt vinden in de vroege lente (bloeitijd vanaf februari), in de latere lente (vanaf mei) en in de zomer (vanaf juni).

We zetten telkens (per etappe én per seizoen) één bloem in de kijker als **“blikvanger”**, met vervolgens wat je in die maanden en op dat traject nog méér kunt ontdekken.

Alle foto's zijn in de loop van 2022 genomen langsheen de wandeling.
Wie nog interessante bloemen ontdekt: neem contact op via reddekeer@live.be om onze wandeling nog rijker en interessanter te maken. Bedankt!

Tip: als je op je gsm <https://waarnemingen.be/apps/obsidentify/> hebt staan kan je veel makkelijker veel meer bloemen determineren!


Bloemen etappe 1: richting de kapel en verder

Blikvanger: Waterranonkel (in de **vroege lente**)

*Hiervoor moet je heel even van de wandeling afwijken en van op het straatje “De Keer” nog **niét** rechts de wei en het bos ingaan, maar eerst 100 meter het straatje verder volgen en rechts in de gracht kijken. En dan terugkeren.*

*De bloeitijd van deze plant: **april tot augustus***

- Er zijn veel schillende soorten waterranonkel (de boterbloem is ook een ranonkel)
- Lang niet meer zo alledaags, beekwater is vaak te vervuild.



Winterpostelein (in de vroege lente)

De bloeitijd van Winterpostelein: april tot juni

- 30 cm / bloem komt ontsproten uit schotelvorming vergroeid bladpaar
- Komt uit Noord-Amerika, eetbaar: bijnaam is “indianen-sla”



Robertskruid (in de vroege lente)

De bloeitijd: april tot november

- 50 cm
- Zoals alle andere geraniumsoorten heeft de vrucht de vorm van een ooievaarsbek



Groene ossentong (in de latere lente)

De bloeitijd: mei tot augustus

- behoort tot de ruwbladigen (voel maar!)
- zeldzaam, tenzij verwilderd uit tuinen



Knopkruid (in de latere lente)

De bloeitijd: *juni tot november*

- naargelang de soort 40 of 60 cm hoog
- er bestaan inderdaad twee soorten: kaal (of klein) en harig knopkruid (zie onderkant blad)



Gewone ereprijs (in de latere lente)

De bloeitijd: april tot juni

- Er zijn heel veel soorten ereprijs! Deze heeft wit hartje



Knolsteenbreek (in de latere lente)

De bloeitijd: *mei tot juni*

- 50 cm
- Zou onze “blikvanger” in dit seizoen kunnen zijn maar er is geen garantie dat hij hier elk jaar staat (links half in de gracht waar je van het straatje De Keer de wei in moet stappen).
- Redelijk zeldzaam
- Er bestaan heel veel steenbreek-soorten.
- Steenbreek werd als galsteen-geneesmiddel beschouwd.



Blikvanger: Salomonszegel (in de **latere lente**)

De bloeitijd: mei tot juni

Als je van op straatje De Keer de wei bent ingestapt, na een dikke honderd meter stoppen waar je naar rechts moet afbuigen en daar links in het bos gaan zoeken naar de Salomonszegel.

- 50-100 cm
- Winter: de wortelstok overleeft, met daarop een zegel-achtige afdruk van de verdwenen stengel: zorgezegd het zegel van de bijbelse koning Salomon.



Blikvanger: Doornappel (zomer)

De bloeitijd: juni tot oktober

Niet ver na de kapel te zien rechts in de hoek van de akker / weide.

- zeldzaam
- 100 cm
- Kwam veel voor op oude mestopslag
- zeer giftig!



Hennepnetel (zomer)

De bloeitijd: juli tot oktober

- tot 100 cm
- Veel soorten hennepnetel
- Eén blad lijkt op één stuk van het handvormig blad van hennep, vandaar de benaming



Bloemen etappe 2: vanaf kruispunt Zavelstraat-Bunderweg

Blikvanger: de slanke sleutelbloem (in de **vroege lente**)



Grootbloemige muur (in de vroege lente)

De bloeitijd van Winterporselein: april tot juni

- 50 cm
- Mooiste van veel soorten muur
- lange fijne lancetbladeren die om zich heen zoeken naar steun



Bosanemoon (in de vroege lente)

De bloeitijd: maart tot mei

- 25 cm
- Hele bloemtapijten, vooral in beukenbossen: die schieten traag in blad dus het blijft lang licht op de grond
- Er bestaat ook een gele variant



Speenkruid (in de vroege lente)

De bloeitijd: februari tot mei

- Broedknolletje
- blijft laag
- naam: wortels lijken op fopspeen (tutter), of misschien ook: een oud speen-geneesmiddel



Pinksterbloem (in de vroege lente)

De bloeitijd: april tot juni

- Rijke honingbron voor insecten
- vaak “speeksel”-schuimnestjes op de plant met daarin de larve van het schuimbeestje (dat zit ook op “echte koekoeksbloem”: koekoeksspog)



Rapunzelklokje (in de latere lente)

De bloeitijd: mei tot juni

- bloempjes wijzen schuin naar boven
- kleur varieert van licht lila tot lichtblauw en soms wit
- het Akkerklokje dat vrij zeldzaam is lijkt hier sterk op, maar dat heeft zijn bloemen gericht naar één zijde.
- gaf zijn naam aan het sprookje



Zilverschoon (in de latere lente)

De bloeitijd: mei tot augustus

- Onderkant blad: zilverbhaard



Teunisbloem (in de latere lente)

De bloeitijd: mei tot juni

- 50-200 cm
- Soorten: grote, middelste en kleine teunisbloem
- naam: bloeit op naamdag Sint-Antonius van Padua.
- Nieuwe bloemen openen zichtbaar-snel met klapje zodra schemering valt
- nachtvlinders komen dan af op de geur



Kattestaart (in de latere lente)

De bloeitijd: juni tot augustus

- 120 cm
- Op één aar kunnen wel 100 bloemen staan.



Blikvanger: Moesdistel (**zomer**)

Kijk rechts in de bermen na de kruising met de Merriebeek (aan elektriciteitspaal 1432), dat is daar waar een aardenweg rechts afslaat.

*De bloeitijd: **juli tot september***

- 150 cm
- Een van de weinige geelbloeiende distels, met ook nog geelgroene bladen rond bloemhoofd
- Het exemplaar op de foto is al ver uitgebloeid



Even tussendoor: valleigebieden

Valleigebieden zijn **belangrijk voor de natuur** !

(nu we hier net over de Merriebeek stappen – nabij elektriciteitspaal 1432)

Natuur en open ruimte zijn superbelangrijk in verband met de klimaatwijziging. Dat weet intussen iedereen en dat zegt ook de Vlaamse regering, maar die wil de Keer tóch volbouwen met 200 ha industrie. Op de Keer vind je veel natte natuur. Die is extra nuttig, want de grondwaterspiegel zakt vaak door de toenemende droogteperiodes. Water moet infiltreren. De industriegebouwen zullen wel netjes alle regenwater opvangen en hergebruiken, maar dat helpt niet voor de grondwaterstand. Infiltratiegrachten zoals wadi's zijn druppels op een hete plaat tussen al het geplande beton.

De versnippering van onze natuur is slecht voor de biodiversiteit. Daarom zijn natuurverbindingen onmisbaar, en die vind je altijd langs de beken. Op de Keer zijn dat deze Merriebeek hier, en in het westen (de kant van Antwerpen): de Diepe Beek. De Merriebeek komt aan het Albertkanaal uit in de Grote Merriebeek, die richting Antwerpen naast het kanaal loopt tot in het Schijn. Zo verbindt de Merriebeek de natuurgebieden van Zevenbergenbos en Hogenaard met de natuur van de Schijnvallei.

Boerenwormkruid (zomer)

De bloeitijd: **juli tot september**

- 120 cm
- Sterke onaangename geur, goed tegen motten en vliegen
- als vroeger ontwormmiddel was het té giftig.



Heelblaadjes (zomer)

De bloeitijd: juli tot september

- tot 90 cm
- Vroeger buikloop- en wondgeneesmiddel (Lat. naam: Pulicaria Dysenterica)



Witte honingklaver (zomer)

De bloeitijd: juli tot september

- 120 cm
- ook gele honingklaver bestaat
- gedroogd = geurt als hooi door cumarine
- werd gebruikt bij trombose



Leverkruid of Koninginnekruid (Zomer)

De bloeitijd: juli tot september

- tot 200cm
- werd gebruikt voor lever, urinewegen, maagkramp...



ijzerhard (Zomer)

De bloeitijd: juli tot oktober

- tot 100cm
- naam: oud geneesmiddel tegen wonden door ijzeren wapens (?) ofwel: stengel zo hard als ijzer.
- magisch, ritueel kruid in de oudheid



Bloemen etappe 3: vanaf de zitbank tot einde

Look-zonder-look (in de vroege lente)

*De bloeitijd van deze plant: **april tot juni***

- tot 120 cm
- Blad fijnwrijven = lookgeur, eetbaar



Zachte ooievaarsbek (in de latere lente)

De bloeitijd van deze ooievaarsbek: mei tot september

- 40 cm
- Zachtbehaarde stengel en blad
- Naam: de vele soorten hebben -net als de balkongeranium- een vrucht in vorm ooievaarsbek.



Blikvanger: Vogelmelk (**zomer**)

Kijk in de bermen ter hoogte van de Q8

Bloeitijd: **juli-sep**

- vrij zeldzaam bolgewasje
- Bloem sluit bij bewolking



Vlasbekje (zomer)

De bloeitijd: **juni tot oktober**

- Oranje lippen sluiten keel kroonbuis af => alleen sterke hommels en bijen raken binnen
- Naam = omdat de smalle bladeren op vlas lijken.



Grijskruid (zomer)

De bloeitijd: juni tot september

- 50 cm
- Stengel en bladeren grijs, vrucht: elliptische hauw (zaad in doosvrucht)
- giftig voor paarden

